

PROTOCOLE D'URGENCE EN CAS DE PIQURE D'HYMENOPTERE

Composition de la trousse d'urgence

Antihistaminique : :CETIRIZINE (Zyrtec) PO, DEXPHLORENIRAMINE (Polaramine) IV
 Dermocorticoïdes : DEXAMETAZONE (Diprosone), DENOSIDE (Tridesonit)
 Corticoïdes : PREDNISOLONE (Solupred)
 Broncho-dilatateur : SALBUTAMOL inhalé
 Adrénaline auto injectable : ANAPEN, ANAKIT, JEXT

DES LES 1^{ERS} SIGNES DONNER LES MEDICAMENTS EN FONCTION DE LA SITUATION ET APPELER LE SAMU (15 ou 112 sur portable) EN CAS DE SIGNE DE GRAVITE

Stades de gravité clinique croissante d'une réaction anaphylactique	Conduite à tenir
<p style="text-align: center;">Réactions locales ou locorégionales ou généralisées</p> <p>Signes cutanéomuqueux : érythème (rougeur au point de piqure), urticaire (plaques rouges sur une partie ou tout le corps) Avec ou sans œdème local, paupières, lèvres gonflées (sans signe respiratoire)</p>	<p>CETIRIZINE : 1 cp/ 24h DEXAMETAZONE (corps) une application au niveau du pont de piqure après désinfection ou DENOSIDE (visage)</p> <p>SURVEILLANCE</p>
<p style="text-align: center;">Réactions généralisées modérées</p> <p>Signes cutaneomuqueux (avec œdème du visage, lèvres, langue) Hypotension et tachycardie inhabituelle Oppression thoracique Signes respiratoires (toux, essoufflement, sifflements), Signes digestifs (nausées, vomissements, douleurs abdominales) Agitation, céphalées</p>	<p>Allonger la personne, libérer les VAS et surélever les jambes DEXPHLORENIRAMINE IV 1 à 2 ampoules SALBUTAMOL inhalé en cas de sifflements (PREDNISOLONE orodispersible 20 1cp par 20kg ou IV) ADRENALINE autoinjectable 1 injection IM à renouveler en cas d'absence d'amélioration et d'aggravation</p>
<p style="text-align: center;">Réactions généralisées sévères</p> <p>Cyanose, hypotension, bradycardie ou tachycardie, collapsus Trouble de conscience, perte de connaissance, convulsions Bronchospasme, œdème laryngé (voix rauque, signes d'asphyxie)</p>	<p>Mettre en position latérale de sécurité ADRENALINE autoinjectable 1 injection IM à renouveler</p>
<p style="text-align: center;">Arrêt cardiocirculatoire</p>	<p>ADRENALINE autoinjectable 1 injection IM à renouveler MASSAGE CARDIAQUE DEFIBRILLATEUR</p>

Noter l'heure d'apparition des signes et les médicaments donnés

Dr Claire Charlanes Maume Médecin de l'Education Nationale

Protocole établi à partir des recommandations de l'ANAES, du collège de médecine d'urgence de Bourgogne (2012) et du congrès de l'AREFORCAL le 2 mai 2015